

COTRIM 240 INY



Es una solución acuosa estéril inyectable. **COTRIM 240**, está indicado para el tratamiento de un amplio número de enfermedades y condiciones de origen bacteriano.

AGENTES PATÓGENOS SENSIBLES

<i>Estafilococos</i>	<i>E. coli</i>
<i>Estreptococos</i>	<i>Salmonelas</i>
<i>Neumococos</i>	<i>Cepas Proteus</i>
<i>Neisseria</i>	<i>Klebsielas</i>
<i>Corinebacterias</i>	<i>Shigelas</i>
<i>Pasteurellas</i>	<i>Brucelas</i>
<i>Anaerobios</i>	<i>Vibriones</i>
	<i>Haemophilus</i>

Total o parcialmente resistentes son:

Streptococcus faecalis *Erysipelothrix*
Pseudomonas *Leptospiras*
Agentes de la Tuberculosis

COMPOSICIÓN

COTRIM 240, contiene Sulfadoxina y Trimetropim en la proporción 5:1.

Sulfadoxina 200 mg

Trimetropim 40 mg

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ESPECIE ANIMAL	Dosis: 3 ml de COTRIM 240/50 KG	APLICACIÓN
<i>Bovinos y Equinos Adultos</i> <i>Bovinos jóvenes y potros</i> <i>Terneros</i>	20-30 ml 2-15 ml 3-5 ml	<i>Bovinos: Vía intravenosa, intramuscular, subcutánea</i>
<i>Cerdas madres</i> <i>Cerdos de engorde</i> <i>Lechones destetados</i> <i>Lechones</i>	8-12 ml 5-8 ml 1-2 ml 0.5-1 ml	<i>Caballos: de preferencia, por vía intravenosa, o intramuscular</i> <i>Cerdos: vía intravenosa, intramuscular, subcutánea</i>
<i>Ovinos adultos</i> <i>Corderos</i>	3.5-5 ml 0.5 ml-1 ml	<i>Ovinos: vía intravenosa, intramuscular</i>

Generalmente basta una aplicación, en caso de no presentarse el éxito terapéutico deseado en el curso de 24 horas, habrá de efectuarse otro tratamiento con la misma dosis a las 48 horas siguientes al tratamiento inicial.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Durante el tratamiento con **COTRIM 240**, se cuidará de suplir de suficiente agua de bebida al animal.

INDICACIONES

La solución de **COTRIM 240**, debido a su amplio espectro de acción, puede emplearse en principio, para el tratamiento de infectopatías bacterianas primarias así como de

infecciones bacterianas secundarias en el curso de virosis de bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

INFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO

Infecciones inespecíficas, bronquitis, bronconeumonía, neumonía, amigdalitis, faringitis, tos inespecífica.

INFECCIONES DEL CONDUCTO GASTROINTESTINAL

Gastritis, enteritis, gastroenteritis(de diversas formas) con y sin infección general o intoxicación.

TRATAMIENTO DE INFECCIONES GENERALES O LOCALES

Septicemia, específicamente con gérmenes problema, infección de heridas, flemones, reticulitis/peritonitis traumática(enfermedad de los bovinos por cuerpos extraños)lesiones infectadas de las pezuñas o cascos. Infecciones de las articulaciones.

ENFERMEDADES DE LA CRIANZA

Parálisis, onfalitis, neumonía, serositis (lechones), gripe de los lechones, difterioide de los terneros.

Rinitis atrófica del cerdo.

PERIODO DE RETIRO

CARNE	28 DÍAS
LECHE	72 HORAS