

fibrocine®

REG. SAGARPA Q-0209-053

Forma farmacéutica: **Solución inyectable**

Uso Terapéutico: **Fibrolítico**

FORMULA:	Cada 100 mL contienen:	
	Tiosinamina	7 g
	Yoduro de sodio	7 g
	Salicilato de sodio	7 g
	Vehículo c.b.p.	100 mL

USO EN ESPECIES: 

INDICACIONES: Medicamento específico para promover la absorción de tejido fibroso patológico, inflamaciones crónicas, fibrosis ovárica, fibrosis del cérvix, mastitis fibrosa y fimosis del prepucio.

FARMACOLOGÍA: **Farmacocinética:** Se absorbe rápidamente en el sitio de aplicación, y viaja por el torrente circulatorio unido a la albúmina plasmática, por lo tanto tiene una buena distribución en todos los tejidos blandos y en mayor cantidad en aquellos que presentan algún aumento de irrigación sanguínea o que presentan cantidades altas de fibrina. Sufre un metabolismo hepático por conjugación y su eliminación es por excreción renal.

Farmacodinamia: La acción fibrinolítica es provocando la hidrólisis de la colágena y promoviendo la absorción de tejido fibroso excesivo.

DOSIS :

Bovinos y equinos	10 mL
Caninos	1 a 2 mL
Porcinos, ovinos y caprinos	5 mL

Repítase la dosis con intervalos de 4 días hasta lograr la normalidad del tejido afectado hasta un máximo de 6 aplicaciones a criterio del médico veterinario.

VÍAS DE

ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

ADVERTENCIAS : No utilizar en felinos.

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

No se deje al alcance de los niños.

Consulte al médico veterinario.

Su venta requiere receta médica.

TIEMPO DE

RETIRO : No usar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

PRESENTACIONES: 50 y 100 mL

