



A Sanofi Company

## Ficha técnica Selpor

Selenio Pour –on para uso tópico en Bovinos.

**Composición:** sustancia clara que contiene 5g/l de Selenio en forma de Selenato de sodio 12,4g/L, CAS 13410,0-01-0 y 300g/l de Dietileno glicol monobutil éter. (CAS 112-34-5)

**Almacenamiento:** mantener en condiciones de ambiente a temperaturas inferiores a los 30 Grados Celcius.

**Recomendaciones de Uso:** tratamiento tópico para bovinos como preventivo y tratamiento de las deficiencias de selenio y los desórdenes causados por su carencia

**Dosis:** 3ml/ 100kg de peso vivo

**Vía de Administración:** Uso Tópico

Insoluble en agua

**Frecuencia de aplicación:** Dos veces al año al postparto y a media gestación; sin problemas para cualquier etapa de la producción

Novillas y terneras cada 6 meses.

**Tiempo de retiro:** No residuos en leche o carne

**Toros de cría y sementales:** 2 veces al año en la dosis recomendada.

### Efectos Secundarios y Toxicidad.

Tóxico si se ingiere o si se inhala, al contacto con la piel y ojos puede causar irritación, el solvente es flamable por lo que se debe de mantener alejado de fuentes de calor. La intoxicación por Selenio incurre en disnea, espasmos y muerte por asfixia.

Es tóxico para organismos acuáticos por lo que hay que tener precaución en el desecho de los envases y restos del producto y no emplearlo más que para su uso recomendado.

www.la.merial.com

