


Quick Bayt[®]

Para el control de plagas domésticas, de la industria y de instalaciones pecuarias



Bayer S.A.
Km. 14.5 Carretera Roosevelt
Z. 3 de Mixco, Ciudad Guatemala
Guatemala, América Central
Tel.: (502) 436 9090
Fax.: (502) 436 9898

A Business Group of
Bayer CropScience



Bayer Environmental Science

Quick Bayt®

Es un cebo en gránulos para el control de mosca doméstica en aplicaciones domésticas, en la industria o en instalaciones pecuarias; por ejemplo: casas, restaurantes, hoteles, oficinas, cocinas, hospitales, industria de alimentos, granjas de aves, granjas de cerdos, establos, lecherías, etc.

CUALIDADES

Fácil de usar. Baja toxicidad para animales de sangre caliente. No es irritante. Contiene Bitrex, para evitar cualquier ingestión accidental. Inmejorable efecto de atracción. Efectivo sobre cepas de moscas resistentes a los productos tradicionales. Buen efecto de abatimiento.

Ingrediente activo	Imidacloprid	• 5 gramos por kilo	CAS 138261-41-3
Clasificación	+ 2 poderosos atrayentes		
Formulación	Insecticida Cloronicotínilo		
Presentaciones	Gránulos en base azúcar		
	2 kilos, 50 gramos		

FORMA DE ACCIÓN

Ingestión. Al ser ingerido por las moscas se adhiere a los receptores nicotínicos de las células nerviosas receptoras, evitando que la acetilcolinesterasa transmita los impulsos nerviosos a las células nerviosas receptoras, lo que conlleva a un deterioro del sistema nervioso y a la muerte del insecto. La muerte ocurre entre uno y quince minutos después de la ingestión.

RECOMENDACIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Tipos De Tratamientos Recomendados	Técnicas De Aplicación	Equipos Recomendados
Tratamientos de acción inmediata	Cebaje mosquicida	No requiere ningún equipo
	Brochado (Pintado)	Brocha

CEBAJE MOSQUICIDA

Aplicar pequeñas cantidades de Quick Bayt en los puntos frecuentados por las moscas. Humedezca ligeramente el cebo para mejores resultados. Aplique en muchos lugares, evitando los sitios frescos y ventosos, ya que las moscas prefieren los lugares calientes para descansar. Se puede colocar el cebo directamente sobre las superficies o utilizar pequeños platos desechables como estaciones de cebaje. Se puede reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

BROCHADO

Para preparar la mezcla para el brochado (pintado), agregue el Quick Bayt en agua tibia, en las cantidades recomendadas y remueva hasta tener una mezcla homogénea. Deje reposar la mezcla durante quince minutos hasta que se forme una pasta de consistencia adecuada para pintar. Aplique la pasta con brocha a las superficies donde descansan las moscas, evitando las superficies con polvo. Puede también pintarse sobre lienzos de cartón o tela, los cuales se colocarán en las áreas frecuentadas por las moscas. Se puede reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

DOSIFICACIÓN

Técnica De Aplicación	Plagas Para Las Cuales Se Recomienda	Dosis de Quick Bayt	Cobertura Recomendada Para El Brochado	Frecuencia De Aplicación
Cebaje mosquicida	Mosca doméstica	2 gramos por metro cuadrado		Reaplicar cuando se contamine el cebo o cuando deje de ser apetecido por las moscas
Brochado (Pintado)		50 gramos + 40 ml de agua tibia	25 metros cuadrados	

Servicio Técnico Local De Bayer Environmental Science

Distribuido Por