

# Racumin® Cebo

Es un raticida de uso general en aplicaciones domésticas, en la industria o en instalaciones pecuarias; por ejemplo: hoteles, industria en general, industria de alimentos, restaurantes, cocinas, oficinas, viviendas, bodegas, granjas de aves, granjas de cerdos, lecherías, establos, etc.

## CUALIDADES

Fácil de usar. Eficaz en el control de ratas. De gran aceptación. Evita la aversión a los cebos causada por los rodenticidas fulminantes. Compatible con el medio ambiente, disminuyendo el riesgo de intoxicación de especies no objetivo. Tiene un antídoto seguro, la vitamina K<sub>1</sub>.

<b>Ingrediente activo</b>	<b>Coumatetralyl</b>	<b>• 0.375 gramos por kilo</b>	<b>CAS 5836-29-3</b>
<b>Clasificación</b>	<b>Raticida anticoagulante de dosis múltiple</b>		
<b>Formulación</b>	<b>Cebo Granular</b>		
<b>Presentaciones</b>	<b>100 gramos</b>		

## FORMA DE ACCIÓN

Ingestión. Al ser ingerido provoca la inhibición de la formación de protrombina, bloqueando el mecanismo de coagulación de la sangre, lo que se traduce en hemorragias internas, que son las que causan la muerte a las ratas. Las ratas mueren de 4 a 7 días después de haber ingerido el cebo, sin causar recelo en el resto de la población, lo que permite que todas se alimenten y se consiga un excelente resultado de control.

## RECOMENDACIONES PARA SU UTILIZACIÓN

<b>Tipos De Tratamientos Recomendados</b>	<b>Técnicas De Aplicación</b>	<b>Equipos Recomendados</b>
Tratamientos raticidas	Cebaje rodenticida en interiores	No requiere ningún equipo

## CEBAJE RODENTICIDA EN INTERIORES

Aplicar el producto en estaciones de cebaje según la dosis y área recomendadas. Las estaciones de cebaje deben ser ubicadas en los caminos utilizados por las ratas, en los sitios donde están causando daño, en los sitios donde se ha observado su presencia o cerca de sus madrigueras. Se deben ubicar preferiblemente en sitios donde las ratas se sientan seguras y se detengan a alimentarse, tales como lugares oscuros, lugares reclusos, en las esquinas, debajo de muebles, etc. Las estaciones de cebaje pueden ser sencillamente colocar el producto sobre cualquier superficie seca (pisos, encima de gabinetes, etc.); o colocar el producto en pequeños platos desechables que luego serán ubicados en los puntos deseados. Debe tenerse el cuidado de no colocar puntos de cebaje en lugares que hayan sido contaminados por las ratas con orina o heces, ya que no consumirían el cebo. Es importante reconocer la especie de rata que se quiere controlar, ya que la rata negra o del tejado tiende a ser de hábito trepador y por lo tanto se recomienda ubicar los puntos de cebaje preferentemente en ubicaciones en lo alto; y la rata noruega o de las alcantarillas tiende a habitar en las partes bajas a nivel del suelo, por lo que los puntos de cebaje deben ir idealmente a ese nivel.



Rata negra o del tejado



Rata noruega o de alcantarilla

**Este producto se utiliza tal y como viene.**

## DOSIFICACIÓN

<b>Técnica De Aplicación</b>	<b>Plagas Para Las Cuales Se Recomienda</b>	<b>Dosis De Racumin Cebo</b>	<b>Frecuencia De Aplicación</b>
Cebaje rodenticida en interiores	Rata negra o del tejado Rata noruega o de alcantarilla	50 a 100 gramos por punto de cebaje. Ubicar una estación de cebaje cada 25 metros cuadrados	Cada vez que las plagas sobrepasen los umbrales aceptables o representen una molestia. Los umbrales aceptables son variables y específicos de cada localidad.

## OBSERVACIONES ADICIONALES

**Este producto no debe ser aplicado en lugares húmedos o en exteriores susceptibles de mojarse.**

Servicio Técnico Local de Bayer Environmental Science	Distribuido Por
---	-----------------