

Starycide® 48 SC

Es un insecticida para el control de estados inmaduros de moscas y escarabajo de la cama en instalaciones pecuarias como granjas de aves, granjas de cerdos, establos, caballerizas, etc.

CUALIDADES

Específico para el control de larvas. Su formulación acuosa no tiene olor, no es inflamable, no es irritante, no mancha superficies y no daña materiales o equipos. Previene y/o revierte el desarrollo de resistencias en los insectos. Compatible con productos adulticidas. Estable a altas temperaturas, a luz solar directa, a la humedad y en superficies alcalinas. De acción prolongada. Inofensivo para organismos superiores como aves, mamíferos, peces y el hombre. No es fitotóxico. De gran rendimiento debido a su concentración de ingrediente activo.

Ingrediente activo	Triflumuron • 480 gramos por litro	CAS 64628-44-0
Clasificación	Insecticida Regulador de Crecimiento	
Formulación	Suspensión Concentrada	
Presentaciones	250 mililitros	

FORMA DE ACCIÓN

Contacto e ingestión. Actúa inhibiendo la formación de la quitina (inhibidor de quitina), lo cual impide la formación de una nueva cutícula o exoesqueleto, causando la muerte de los estados inmaduros (larvas o ninfas) de los insectos, cuando éstos son incapaces de completar el proceso de muda hacia la siguiente fase de desarrollo.

RECOMENDACIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Tipos De Tratamientos Recomendados	Técnicas De Aplicación	Equipos Recomendados
Tratamientos de acción prolongada	Aspersión de acción prolongada	Bombas de mochila manuales tipo Hudson X-Pert, Matabi, etc.

ASPERSIÓN DE ACCIÓN PROLONGADA

Asperjar la mezcla a la dosis y cobertura recomendadas directamente sobre la gallinaza o sobre los materiales donde se desarrollan las larvas de moscas o escarabajo de la cama. Utilizar los equipos de aspersión a baja presión o sin boquilla, para lograr la cobertura deseada por litro de mezcla. Se puede reingresar a las áreas tratadas inmediatamente después de la aspersión.

DOSIFICACIÓN

Técnica De Aplicación	Plagas Para Las Cuales Se Recomienda	Dosis De Starycide 48 SC	Cobertura Por Litro De Mezcla	Frecuencia De Aplicación
Aspersión de acción prolongada	Larvas de mosca Escarabajo de la cama	5 ml por litro de agua	5 metros cuadrados	Se hace necesario volver a aplicar cada vez que las plagas sobrepasen los umbrales aceptables