



Enterisol® Ileitis

Reg. SAGARPA B-0171-020

Vacuna viva oral contra
Lawsonia intracellularis,



FÓRMULA:

Contiene cultivo vivo avirulento liofilizado de *Lawsonia intracellularis*, cepa B3903.

INDICACIONES:

Recomendado para la vacunación de cerdos sanos susceptibles de 3 semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención y control de la Enteropatía proliferativa porcina (ileitis) en su forma clínica y subclínica causada por *Lawsonia intracellularis*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 dosis en agua de bebida en cerdos de 3 semanas de edad o mayores, consultar el instructivo para mayor información.

Vía: oral, en agua de bebida.

ADVERTENCIAS:

- Vacune sólo animales sanos.
- Manténgase entre 2° y 7° C, protegido de la luz solar directa.
- Evite su congelación.
- Agite el frasco antes de usar.
- Utilice todo el contenido una vez abierto el frasco.
- No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- Incinere el frasco vacío.
- No usar en hembras gestantes ni sementales.
- No use este producto junto con antibióticos.
- Retire el uso de antibióticos en el agua y/o en el alimento, tres días antes y tres días después de la vacunación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- En caso de reacciones anafilácticas utilice epinefrina como antídoto.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 100 ml (50 dosis).

Consulte al Médico Veterinario.

"Apague la bomba de tiempo".

>>> BIOLÓGICOS

Boehringer
Ingelheim