

PECAMOXIL PREMIX 20%

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-2782-097

FICHA TÉCNICA

Versión 01

NOMBRE	PECAMOXIL PREMIX 20%
INGREDIENTES ACTIVOS	Amoxicilina base (como trihidrato) 20 %
CLASE TERAPÉUTICA	Uso veterinario.
DESCRIPCIÓN	PECAMOXIL PREMIX 20% contiene un antibiótico penicilínico de amplio espectro indicado para aves, porcinos y bovinos en la prevención y tratamiento de enfermedades digestivas, respiratorias, genitourinarias, cutáneas, articulares e infecciones septicémicas.
FORMA FARMACÉUTICA Y DE USO	Premezcla con el alimento.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA	Antibacteriano.
INDICACIONES DE USO	PECAMOXIL PREMIX 20% contiene un antibiótico penicilínico de amplio espectro indicado para aves, porcinos y bovinos en el tratamiento de las enfermedades digestivas, respiratorias, genitourinarias, cutáneas, articulares e infecciones septicémicas causadas por gérmenes susceptibles a la acción de la amoxicilina tales como: <i>Pasteurella spp</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> , <i>Streptococcus suis</i> , <i>Clostridium spp</i> , <i>Bordetella bronchiseptica</i> , <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> en porcinos; <i>Pasteurella spp</i> , <i>Haemophilus spp</i> , <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> , <i>Salmonella spp</i> , <i>Shigella spp</i> y <i>Clostridium spp</i> en aves; y <i>Streptococcus spp</i> , <i>Staphylococcus spp</i> , <i>Bacillus spp</i> , <i>Corynebacterium spp</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> y <i>Clostridium spp</i> en bovinos.
DOSIS RECOMENDADA	Oral mezclado en el alimento. Se recomiendan las siguientes dosis de ingredientes activo: Bovinos: 7-22 mg/kg (equivalente de 1.5 a 2.5 kg de producto/ton alimento). Porcinos: 20 mg/kg (equivalente de 2.8 a 3.8 kg de producto/ton alimento). Aves: 10 mg/kg (equivalente de 1.5 a 2.5 kg/ton alimento). Aplicar el tratamiento por un periodo de 7 días cada 24 horas.
VÍAS DE APLICACIÓN	Oral, en el alimento.



FICHA TÉCNICA

Versión 01

ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Aves (reproductoras pesadas y ligeras, crianza comercial y pollo de engorda), porcinos y bovinos (carne).
TIEMPO DE SUPRESIÓN	No administrar este producto antes del sacrificio de: Aves: 7 días. Bovinos: 25 días. Porcinos: 15 días. No se administre el producto en producción de leche que se destine al consumo humano. No administrar a gallinas de postura cuyos huevos se destinen a consumo humano.
TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀)	DL ₅₀ Oral rata > 15,000 mg/kg.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Sin información.
ANTÍDOTO	Sin información.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO	Mantener el producto protegido de la luz directa, en lugar fresco y seco.
PRESENTACIONES	Saco con 20 kg.

