

PECFLUNIX

NUMERO DE REGISTRO Q-2782-085

FICHA TÉCNICA

Versión 01

NOMBRE	PECFLUNIX
INGREDIENTES ACTIVOS	Flunixin (como meglumina de flunixin) 5 %
CLASE TERAPÉUTICA	Uso veterinario.
DESCRIPCIÓN	PECFLUNIX es un producto que contiene un potente desinflamatorio no esterooidal ni narcótico, con propiedades analgésicas y antipiréticas.
FORMA FARMACÉUTICA Y DE USO	Solución inyectable.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA	Desinflamatorio, analgésico y antipirético.
INDICACIONES DE USO	PECLFUNIX contiene meglumina de flunixin, que es un desinflamatorio no esterooidal ni narcótico, con propiedades analgésicas y antipiréticas. Se recomienda en los procesos inflamatorios agudos asociados a enfermedades respiratorias, septicemia, mastitis, metritis, agalactia y para el tratamiento de padecimientos que involucren inflamación, dolor y fiebre de bovinos, porcinos, equinos y caninos.
DOSIS RECOMENDADA	Bovinos: 1 a 2 ml por cada 45 kg de peso por vía IV ó IM, repitiendo en caso necesario 12 horas después. Porcinos: 2 ml por cada 45 kg de peso por vía IM, repitiendo en caso necesario 12 horas después. Equinos: 1 ml por cada 45 kg de peso por vía IV ó IM, una aplicación al día por un máximo de 5 días. Caninos: 0.1 a 0.44 ml por cada 10 kg de peso vía IV ó IM, una aplicación al día por un máximo de 3 días.
VÍAS DE APLICACIÓN	Intramuscular o intravenosa en bovinos, equinos y caninos. Intramuscular en cerdos.
ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Cerdos, bovinos (carne y leche), equinos y caninos.
TIEMPO DE SUPRESIÓN	El periodo de retiro antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano es de 7 días para bovinos y 21 días para cerdos. No utilizar en equinos para consumo humano. No administrar a hembras gestantes.



FICHA TÉCNICA

Versión 01

No administrar a hembras en producción de leche y terneros.
No administrar a caninos menores de 3 meses de edad.
Debe evitarse el uso prolongado en caninos debilitados o cuando se este administrando otra terapia antiinflamatoria.
No usar en casos de daño renal o hepáticos severos, ni en animales con lesiones de mucosa gastrointestinales causadas por endoparásitos.
No usar en cólicos causados por íleo y asociados a deshidratación.
En caninos no administrar más de una vez en aquellos que han recibido tratamiento con corticoesteroides.

TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀)

Sin información.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Los principales efectos adversos para los desinflamatorios no esteroidales en general son irritación gastrointestinal y ulceración. Otros son vómito, necrosis renal papilaria y ocasionalmente sarpullido cutáneo.
Los efectos adversos son frecuentemente asociados a dosis inapropiadas.
La deshidratación y el daño de la función renal están contraindicados para administrar flunixin.

ANTÍDOTO

Sin información.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Conservar en lugar fresco y seco, en frascos bien cerrados.
Debe conservarse entre 2 y 30 °C.

PRESENTACIONES

Frascos con 20, 50, 100 y 250 ml.

