

PECNISTREP-D

Reg. SAGARPA Q-2782-082

FICHA TÉCNICA

Versión 01

NOMBRE	PECNISTREP-D
INGREDIENTES ACTIVOS	Penicilina G Benzatina, Penicilina G Procaína, Penicilina G Sódica, Dihidroestreptomicina (sulfato) y Estreptomicina (sulfato).
CLASE TERAPÉUTICA	Uso veterinario.
DESCRIPCIÓN	PECNISTREP-D (polvo inyectable) es un producto inyectable que contiene una combinación de penicilinas de inmediata, media y larga acción, además de estreptomicina y diclofenaco. Este último de acción desinflamatoria, antitérmica y analgésica. PECNISTREP-D está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias, genitourinarias y sistémicas causadas por microorganismos sensibles a la fórmula en bovinos y porcinos.
FORMA FARMACÉUTICA Y DE USO	Polvo inyectable con diluyente estéril adjunto.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA	Antibacteriano y desinflamatorio.
INDICACIONES DE USO	Uso antibacteriano, indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias, genitourinarias y sistémicas, causadas por microorganismos susceptibles a la fórmula.
DOSIS RECOMENDADA	Mezcle el contenido del frasco ampula con el diluyente específico y aplíquese por vía intramuscular a razón de 1 ml/20 kg de peso corporal (eq. a 20 000 U.I.). Si el volumen por aplicar es mayor de 10 ml se recomienda inyectar en diferentes zonas. La dosis se puede repetir a las 72 horas de acuerdo al criterio del médico y durante 6 días.
VÍAS DE APLICACIÓN	Intramuscular.
ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Bovinos (carne y leche) y cerdos.
TIEMPO DE SUPRESIÓN	No debe de usarse este producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano. La leche procedente de vacas tratadas no deberá consumirse hasta 72 horas después de la última aplicación.



FICHA TÉCNICA

Versión 01

TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀)

Penicilina G procaína: Ratón, SC: 2.3 g/kg. Pollos, IM: 2.5 MUI/kg.
Dihidroestreptomicina: Pollos (1 semana de edad), IM: 744 mg/kg.
Pollos (4 semanas de edad), IM: 1868 mg/kg.
Diclofenaco: Ratón, oral: 390 mg/kg. Rata, oral: 150 mg/kg.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Las penicilinas pueden causar hipersensibilidad después de la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. Reacciones de alergia incluye: sarpullido, hinchazón en cara, labios y ojos o dificultad para respirar.

Estreptomicina puede causar daño vestibular sólo en dosis diarias y acumulativas pero ningún efecto tóxico ocurre si se da a las dosis recomendadas por arriba de 1 semana.

ANTÍDOTO

Sin información.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Conservarse en lugar fresco y seco, en recipientes bien cerrados, resistentes a la luz.

PRESENTACIONES

Frasco vial con 40 MUI de penicilinas totales.
Diluyente con 100 ml.

