

PECOLICINA SP PREMIX

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-2782-052

FICHA TÉCNICA

Versión 01

NOMBRE	PECOLICINA SP PREMIX
INGREDIENTES ACTIVOS	Lincomicina base 2.2 % Espectinomomicina base 2.2 %
CLASE TERAPÉUTICA	Uso veterinario.
DESCRIPCIÓN	PECOLICINA SP PREMIX se recomienda en la prevención y control de disentería porcina, enteritis asociada con <i>E.coli</i> , salmonelosis, neumonía bacteriana y micoplásmica.
FORMA FARMACÉUTICA Y DE USO	Premezcla con el alimento.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA	Antibacteriano.
INDICACIONES DE USO	En la prevención y control de disentería porcina, enteritis asociada con <i>E. coli</i> , salmonelosis, neumonía bacteriana y micoplásmica, y para incrementar la conversión alimenticia.
DOSIS RECOMENDADA	Aplicar 1 kg por tonelada de alimento (eq. a 3.5 mg de lincomicina/kg de peso).
VÍAS DE APLICACIÓN	Oral, en el alimento.
ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Cerdos.
TIEMPO DE SUPRESIÓN	No usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀)	Lincomicina, DL ₅₀ oral rata: ≥ 5000 mg/kg. Espectinomomicina DL ₅₀ oral ratón: 5724 mg/kg.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Sin información.
ANTÍDOTO	Sin información.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO	Mantener el producto protegido de la luz, en lugar fresco y seco.
PRESENTACIONES	Saco con 25 kg.

