

PECSULPRIM INYECTABLE

NUMERO DE REGISTRO Q-2782-011

FICHA TÉCNICA

Versión 01

NOMBRE	PECSULPRIM INYECTABLE
INGREDIENTES ACTIVOS	Trimetoprim 4 % Sulfametoxazol 20 % Lidocaína 0.5 %
CLASE TERAPÉUTICA	Uso veterinario.
DESCRIPCIÓN	PECSULPRIM INYECTABLE es la combinación de sulfametoxazol y trimetoprim para lograr un efecto sinérgico bactericida. PECSULPRIM INYECTABLE proporciona un amplio espectro de actividad antibacteriana, elevada distribución tisular y baja toxicidad.
FORMA FARMACÉUTICA Y DE USO	Solución inyectable.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA	Antibacteriano.
INDICACIONES DE USO	PECSULPRIM INYECTABLE es un bactericida cuya acción corresponde a los antibióticos de amplio espectro. Por su acción contra bacterias grampositivas y gramnegativas, está indicado en infecciones de las vías respiratorias, renales y tracto digestivo.
DOSIS RECOMENDADA	Para bovinos (de carne), equinos, ovinos, caprinos y porcinos 1 ml por cada 15 kg de peso una vez al día durante 5 días. Para aves diluir 100 ml por cada 1500 ml de suero fisiológico y aplicar 1 ml por kg de peso una vez al día durante 5 días.
VÍAS DE APLICACIÓN	Intramuscular.
ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Bovinos (de carne), equinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves (reproductoras, progenitoras, crianza, postura comercial, pollo de engorda y aves de combate).
TIEMPO DE SUPRESIÓN	No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. No consumir la leche de animales tratados con este producto hasta después de 5 días. No consumir el huevo de las aves tratadas con este producto hasta 10 días. No administrar este producto a equinos destinados a consumo humano.



FICHA TÉCNICA

Versión 01

TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀)

Sulfametoxazol: Rata, oral: 6200 mg/kg: ratón, oral: 5512 mg/kg.

Trimetoprim: Rata, oral: 200 mg/kg: ratón, oral: 7000 mg/kg.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Sulfametoxazol puede producir cristaluria, anemia aplásica, trombocitopenia, náusea, vómito, anorexia y diarrea, reacciones de hipersensibilidad como fiebre, comezón, prurito, fotosensibilidad, dermatitis.

Trimetoprim puede producir reacciones relativamente no tóxicas, aunque puede presentarse prurito, comezón, disturbios gastrointestinales como náusea, vómito.

ANTÍDOTO

Sin información.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

PRESENTACIONES

Frascos con 100 y 250 ml.

