

PECTIOFUR LPU

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-2782-080

FICHA TÉCNICA

Versión 01

NOMBRE	PECTIOFUR LPU
INGREDIENTES ACTIVOS	Ceftiofur (como clorhidrato) 5 %
CLASE TERAPÉUTICA	Uso veterinario.
DESCRIPCIÓN	PECTIOFUR LPU es un producto es suspensión inyectable que contiene 5 g activos de ceftiofur contenido en frasco de 100 ml, el cual es recomendado para el control de enfermedades de cerdos y bovinos, causadas por microorganismos susceptibles a la fórmula.
FORMA FARMACÉUTICA Y DE USO	Suspensión inyectable.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA	Antibacteriano.
INDICACIONES DE USO	PECTIOFUR LPU contiene una cefalosporina de tercera generación y está indicado para el tratamiento de enfermedades de cerdos y bovinos (carne y leche) causadas por microorganismos sensibles a la fórmula.
DOSIS RECOMENDADA	En bovinos (carne y leche) de 1 a 2 mg/kg de peso corporal (de 1 a 2 ml por cada 50 kg de peso), cada 24 horas por 3 a 5 días máximo. En porcinos de 1 a 3 mg/kg de peso corporal (de 1 a 3 ml por cada 50 kg de peso), cada 24 horas por 3 días consecutivos.
VÍAS DE APLICACIÓN	Solo intramuscular en porcinos. En bovinos subcutánea o intramuscular.
ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Bovinos (carne y leche) y porcinos.
TIEMPO DE SUPRESIÓN	Los animales tratados no deben ser sacrificados antes de las 24 horas siguientes al último tratamiento. No se consuma la leche de animales tratados hasta 24 horas después del último tratamiento.
TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀)	No existe información.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Puede producirse comezón, fiebre, linfadenopatía y eosinofilia. Las cefalosporinas pueden causar dolor en el sitio de la inyección cuando se administra IM.
ANTÍDOTO	Sin datos.



FICHA TÉCNICA

Versión 01

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Almacenar a temperatura de 15°C a 30°C y protegido de la luz y la humedad. Una vez abierto utilizar el total del frasco dentro de las siguientes 2 semanas.

PRESENTACIONES

Frasco con 50, 100 Y 250 ml.

