

PECVERMIN 0.6% PREMIX

NUMERO DE REGISTRO Q-2782-077

FICHA TÉCNICA

Versión 01

NOMBRE	PECVERMIN 0.6% PREMIX
INGREDIENTES ACTIVOS	Ivermectina 0.6 %
CLASE TERAPÉUTICA	Uso veterinario.
DESCRIPCIÓN	<p>PECVERMIN 0.6% PREMIX es un antiparasitario de amplio espectro que contiene Ivermectina, una sal tanto seguro como efectiva, cuya actividad ha sido ampliamente comprobada.</p> <p>PECVERMIN 0.6% PREMIX se absorbe eficientemente en el tracto intestinal alcanzando altos niveles terapéuticos en todo el organismo.</p>
FORMA FARMACÉUTICA Y DE USO	Premezcla con el alimento.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA	Antiparasitario.
INDICACIONES DE USO	<p>PECVERMIN 0.6% PREMIX está indicado en el control y tratamiento de parásitos internos (nematodos pulmonares, gastrointestinales y renales en estados larvarios o de completo desarrollo) y externos (sarna y piojos), comunes en porcinos y aves, durante sus etapas de crecimiento y de reproducción.</p>
DOSIS RECOMENDADA	0.3 a 1.7 kg de PECVERMIN 0.6% PREMIX por tonelada de alimento.
VÍAS DE APLICACIÓN	Oral, en el alimento.
ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Aves (reproductoras, progenitoras, crianza, aves de combate, pollo de engorda) y cerdos.
TIEMPO DE SUPRESIÓN	No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los cerdos y 7 días en aves destinadas al consumo humano.
TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀)	Ivermectina, DL ₅₀ oral ratón: 25 mg/kg; oral rata: 50 mg/kg.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Ningún efecto adverso en animales en reproducción ha sido detectado. En pollos dosificados con 5.4 mg/kg de peso produce ligera somnolencia.



FICHA TÉCNICA

Versión 01

ANTÍDOTO

Fisostigmina a razón de 1 mg/animal por vía intravenosa; picrotoxina a dosis de 1 a 8 mg aplicada en 3 horas por vía intravenosa y, a veces, glicopirrolato a dosis de 0.01 mg/kg/vía intravenosa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener el producto protegido de la luz, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIONES

Saco con 5 kg.

