

**LABORATORIOS****ANDOCI, S.A.**

GUADALUPE I. RAMÍREZ No. 51 TEPEPAN, XOCHIMILCO. MÉXICO, D.F. C.P. 16020

R.F.C.: LAN790810BB4

TELS.: 5676-1920, 5676-5599, 5676-5870, 5676-8040 FAX: 56750538

www.andoci.com

FICHA TÉCNICA. UBRICINA®

1	PRODUCTO:	UBRICINA®
2	REGISTRO SAGARPA	Q-0209-006
3	CLASE TERAPÉUTICA:	Emoliente, rubefaciente y antiinflamatorio.
4	FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA:	Cada 100 g contienen: Salicilato de metilo 1.5 g Aceite de eucalipto 2.0 g Aceite de trementina 4.0 g Ácido fénico 3.0 g Excipiente c.b.p. 100 g
5	REFERENCIAS INTERNACIONALES:	▪ USP 32, NF 25, Vol. 1
6	REFERENCIAS DE ORIGEN:	▪ FEUM, 8ª Ed., Tomo 1. ▪ Métodos internos. Laboratorios Andoci, S.A.
7	DESCRIPCIÓN:	Masa untuosa de color rosa pálido con olor característico a fenol.
8	FORMA FARMACÉUTICA DE USO:	Ungüento
9	MECANISMO DE ACCIÓN:	El ácido fénico actúa a nivel de las terminaciones nerviosas que se localizan en los estratos de la piel, logrando el efecto analgésico. El salicilato de metilo, aceite de eucalipto ya aceite de trementina provocan un efecto rubefaciente aumentando la irrigación en la zona de aplicación, logrando un efecto desinflamatorio y un efecto de calor benéfico.
10	CONTROL DE CALIDAD:	10.1. Descripción: Método interno
		10.2. Identificación de fenol Método interno
		10.3. Valoración de ácido fénico Método interno.
11	INDICACIONES DE USO, DOSIS RECOMENDADAS, VÍAS DE APLICACIÓN Y ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Tratamiento externo de inflamaciones en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos. Excelente coadyuvante en el tratamiento de mastitis y edema post parto. Muy útil en el tratamiento de esguinces, distensiones tendinosas, contusiones, procesos artríticos, reumáticos y abscesos. Dosis: Aplicar directamente en la zona inflamada o lesionada una cantidad abundante del producto mediante un masaje rotatorio durante unos minutos para permitir la penetración del medicamento. Repítase el tratamiento cada 24 horas, hasta que sane completamente la lesión. Vía de administración: Tópica. Local, en el área afectada.
12	TOXICIDAD EN HUMANOS:	La sobreexposición puede causar irritación de las vías respiratorias.
13	LMR:	No aplica
14	IDA:	No aplica
15	TIEMPO DE RETIRO:	No requiere tiempo de retiro.
16	TOXICIDAD EN ANIMALES:	No descrita
17	EFECTOS INDESEADOS:	No descritos.
18	ANTÍDOTO:	No aplica
19	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Mantener el envase cerrado. No se deje al alcance de los niños.



LABORATORIOS

ANDOCI, S.A.

GUADALUPE I. RAMÍREZ No. 51 TEPEPAN, XOCHIMILCO. MÉXICO, D.F. C.P. 16020

R.F.C.: LAN790810BB4

TELS.: 5676-1920, 5676-5599, 5676-5870, 5676-8040 FAX: 56750538

www.andoci.com

20	OBSERVACIONES:	No aplicar directamente en heridas abiertas. Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.
----	-----------------------	---